

BONZI® – BRINGT POINSETTIEN IN FORM

Bonzi ist ein neuer Wachstumsregulator in Zierpflanzen im Gewächshaus, der in allen Beet- und Balkonpflanzen sowie in Topfpflanzen sicher einsetzbar ist. Dank der raschen und nachhaltigen Wirkung beeinflusst Bonzi zuverlässig das Wachstum der Pflanzen und erhöht die Profitabilität der Kulturen.

PRODUKTPROFIL BONZI IN POINSETTIEN

<i>Wirkstoff</i>	4 g/l Paclobutrazol
<i>Formulierung</i>	Suspensionskonzentrat
<i>Wirkstoffklasse</i>	Triazole
<i>Wirkmechanismus</i>	Hemmung der frühen Gibberellinbiosynthese
<i>Wirkungsweise</i>	Die Zellstreckung und Zellteilung wird gehemmt und das vegetative Wachstum nachhaltig gebremst. Kürzere Internodien und eine intensivere Brakteenausfärbung sind die Folgen.
<i>Wirkstoffaufnahme</i>	Aufnahme über Triebe, Blattachseln und Wurzeln
<i>Wirkstoffverteilung</i>	Über den Xylem-Transport in die Triebspitzen
<i>Aufwandmenge</i>	2,5 l/ha in 1000–2000 l Wasser/ha, BBCH 12–BBCH 61
<i>Anzahl Applikationen</i>	max. 10 Applikationen pro Kultur und Jahr, im Abstand von mind. 3 Tagen Beginn kurz nach dem Stutzen bis zur ersten Kurztagswoche
<i>Anwendung</i>	Spritzverfahren im Gewächshaus auf vollständig versiegelten Flächen
<i>Gebindegröße</i>	1 l Gebinde

Bonzi – Aufnahme und Verteilung

Der Wirkstoff Paclobutrazol wird durch grünes Blattgewebe, Stängel und Wurzeln aufgenommen und über das Xylem in die Triebspitzen verteilt. Die Aufnahme durch verholztes Gewebe ist nicht möglich. Für die optimale Aufnahme ist eine gleichmäßige Benetzung erforderlich, die durch Wasseraufwandmengen von 100–200 ml/m² gewährleistet wird. Wassermengen deutlich über 200 ml/m² können unerwünscht hohe Hemmwirkungen nach sich ziehen. Die Wassermenge ist so anzupassen, dass Abtropfen vermieden wird. Eine Anwendung im Gießverfahren ist daher ausgeschlossen.

Bonzi – rasche und nachhaltige Wuchsregulierung

Bonzi wirkt schnell und ist sehr flexibel einsetzbar, je nach Wüchsigkeit der Kultur. In vielen Fällen wird ein kompakter Wuchs durch wiederholte Applikationen mit weniger hohen Aufwandmengen erzielt. Die Verträglichkeit von Bonzi in Zierpflanzen ist sehr gut, unverträgliche Arten und Sorten sind bisher nicht bekannt.

Bonzi – Formulierung und Mischbarkeit

Bonzi ist anwenderfreundlich als Suspensionskonzentrat formuliert und kann problemlos mit in Zierpflanzen üblichen Pflanzenschutzmitteln (z. B. Switch®, Plenum® WG, Vertimec® Pro) gemischt werden, ohne Schäden zu verursachen.



syngenta.



BONZI – EMPFEHLUNG IN POINSETTIEN:

Insbesondere bei stark wachsender Ware sind Hemmstoffbehandlungen notwendig. Damit wird eine gute Blattgarnierung im unteren Pflanzenbereich erzielt und die Gefahr von Triebbruch verringert.

Empfohlene Aufwandmengen:

Schwach – bis mittelstark wachsende Sorten (Mira, Sigma, Cortez®, Neva):

0,25–1,0 l/ha in 1000–2000 l Wasser/ha (100–200 ml Wasser/m²)

Starkwachsende Sorten (Mars, Titan):

0,5–1,5 l/ha in 1000–2000 l Wasser/ha (100–200 ml Wasser/m²)

Einsatztermin:

Eine erste Behandlung erfolgt bei 1–2 cm Triebzuwachs nach dem Stutzen (✂). Folgebehandlungen richten sich nach dem Zuwachs (ein- bis zweimal wöchentlich) und sollten in der ersten Kurztags (KT)-woche enden, um die Brakteengröße nicht zu beeinflussen.

Topfgröße 12–13 cm, 5–6 Brakteen															
Kulturwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Blüte													☼	☼	☼
Hemmung			✂	Bonzi	→ bis in die 1. KT-woche										
Temperatur	18–20°C					17°C			18–20°C			16–18°C			

Topfgröße 10,5 cm, 3–5 Brakteen													
Kulturwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Blüte											☼	☼	☼
Hemmung		✂	Bonzi bis in die 1. KT-woche										
Temperatur	18–20°C			17°C			18–20°C			16–18°C			

Topfgröße 6 cm, 1 Braktee, Mini									
Kulturwoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Blüte								☼	☼
Hemmung	Bonzi	Bonzi	Bonzi						
Temperatur	17°C			17–19°C			16–18°C		

BONZI – IHRE VORTEILE IN POINSETTIEN

Bonzi ist wirksam

- Rasche und nachhaltige Wirkung
- Gute Blattgarnierung im unteren Pflanzenbereich

Bonzi ist flexibel

- Breiter Anwendungsbereich bei Mini, Midi und Mehrtrieber
- Bis zu 10 Applikationen pro Kultur und Jahr sind erlaubt

Bonzi ist zuverlässig

- Sehr gut verträglich, auch in Mischungen
- hinterlässt keine Spritzflecken
- kein negativer Einfluss auf die Brakteenausfärbung



Bonzi®

syngenta

Syngenta Agro GmbH
Am Technologiepark 1–5 · 63477 Maintal
Tel. 06181/9081-0 · Fax 06181/9081-281
www.syngenta.de

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen Syngenta Verkaufsware. Diese Informationen gelten nur für das Vertriebsgebiet Deutschland. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand November 2015

BeratungsCenter **0800/32 40 275** (gebührenfrei)

® = Eingetragene Marke einer Syngenta Konzerngesellschaft
TM = Angemeldete Marke einer Syngenta Konzerngesellschaft